

BACTIGRAS®

Pansement De Tulle Gras A l'Acétate De Chlorhexidine

STERILE R Stérilisé par rayonnement ionisant. Ne pas restériliser. Ne pas réutiliser. Ne pas utiliser le contenu si le sachet est ouvert ou endommagé. Conserver à plat et au sec (<25°C).

Description

BACTIGRAS est une compresse tissée de gaze imprégnée de vaseline (White Soft Paraffin, Br. Ph.) contenant 0,5% d'acétate de chlorhexidine. Il est présenté stérile, soit en pansement individuel en sachets pelables, soit en rouleaux dans des sachets qui s'ouvrent à l'aide de pattes de pelabilité.

Mode d'action

BACTIGRAS agit en tant que barrière entre la plaie et le pansement secondaire, permettant à l'exsudat de passer jusqu'au pansement secondaire absorbant.

L'antiseptique, acétate de chlorhexidine, est lentement libéré par le pansement ; il en résulte une action prolongée contre les bactéries Gram + et Gram -.**Indications**

BACTIGRAS est à utiliser uniquement en soins locaux.

Il est indiqué pour une vaste gamme de plaies comportant un risque d'infection, ou pour les plaies déjà infectées, en conjonction avec des antibactériens systémiques. La gamme de plaies sur lesquelles BACTIGRAS peut être utilisé comprend :

- les brûlures mineures et les phlyctènes
- les plaies de laceration, d'abrasion et autres, avec perte de peau
- les sites donneurs ou récepteurs de greffe
- les ulcères de jambes.

Instructions d'utilisation

1. Practiquer une détorsion de la plaie selon les procédures normales.

Présentation

Code Dimensions Conditionnement

Fabriquant

Fabriqué en Angleterre par

Smith & Nephew Medical Limited, Hull HU3 2BN

*Marques Déposées de Smith & Nephew

© Smith & Nephew 2003

www.smith-nephew.com

BACTIGRAS®

Chlorhexidinazetat- baumwollgazeverband

STERILE R Zum einmaligen Gebrauch. Gammasterilisation. Bei offener oder beschädigter Verpackung nicht verwenden. Bitte liegend und trocken aufbewahren (<25°C).

2. Sélectionner un pansement de dimension adéquate et ouvrir le sachet pelable (ou déchirer l'extrémité de l'emballage en rouleau).

3. En utilisant gants et pinces, retirer les papiers protecteurs (le papier protecteur dans le cas d'emballage en rouleau).

4. Recouvrir la plaie en couche unique en contact direct avec la surface de la plaie.

5. Appliquer un pansement secondaire absorbant si nécessaire, et maintenir en place au moyen d'un bandage ou d'un pansement de fixation.

6. Retrait: BACTIGRAS peut être laissé en place lorsque le pansement secondaire absorbant est changé. La fréquence de changement dépend des circonstances cliniques et pourra varier de plus d'une fois par jour à deux fois par semaine.

7. Si le pansement adhère, décoller le avec du sérum physiologique.

Précautions d'emploi

BACTIGRAS ne doit pas être utilisé

sur plus de 10% de la surface corporelle.

Il ne doit pas être utilisé dans les cas connus de sensibilité ou d'allergie à la chlorhexidine.

Dermatite, sensibilité de contact ou photosensibilité peuvent exceptionnellement survenir. Des réactions à la chlorhexidine de type choc anaphylactique ont été rapportées, mais sont rares.

Eviter le contact avec les yeux, l'oreille moyenne, les méninges et le cerveau.

BACTIGRAS est incompatible avec

les savons et autres agents

anioniques (tels que certains détergents cutanés), ainsi qu'avec l'iode de potassium.

L'utilisation de BACTIGRAS avec des agents détergents de plaie oxydants (tels que Eusol, peroxydes et solutions iodées) doit être évitée.

Gebrauchsanweisung

1. Die Wunde mit einer Standardmethode reinigen.

2. Den Verband mit der richtigen Größe auswählen und den Beutel öffnen (Bei der Rollenverpackung an der Kerbe aufreißen).

3. Mit Hilfe einer Zange oder unter

Handelsformen

Bestell-Nr.

Abmessung

Verkaufseinheit

Karton mit 50 Stück

Karton mit 10 Stück

Karton mit 50 Stück

Karton mit 10 Stück

Karton mit 10 Stück

Karton mit 12 Rollen

Hersteller

Hergestellt in England von

Smith & Nephew Medical Limited, PO Box 81, Hessle Road, Hull HU3 2BN

*Warenzeichen von Smith & Nephew

© Smith & Nephew 2003

www.smith-nephew.com

BACTIGRAS®

Apósticos De Gasa Parafinada Con Acetato De Clorhexidina

STERILE R Zum einmaligen Gebrauch. Gammasterilisation. Bei offener oder beschädigter Verpackung nicht verwenden. Bitte liegend und trocken aufbewahren (<25°C).

Benutzung von Handschuhen die Schutzpapiere entfernen (das Schutzpapier bei der Rollenverpackung).

4. Nun BACTIGRAS so applizieren, daß ein direkter Kontakt mit der Wunde entsteht.

5. Falls notwendig, einen absorbierenden Sekundärverband anlegen und den korrekten Sitz mit einem Fixiervlies oder einer Fixierbinde sichern.

6. Entfernen des Wundverbandes. BACTIGRAS muß nicht abgenommen werden, wenn der absorbierende Sekundärverband gewechselt wird. Die Häufigkeit der Verbandwechsel hängt von den klinischen Umständen ab und kann zwischen mehr als einmal täglich und zweimal wöchentlich variieren.

7. Falls der Wundverband mit der Wunde verklebt, läßt er sich durch Befüchten mit steriler Kochsalzlösung vorsichtig ablösen.

8. Si le pansement adhère, décoller le avec du sérum physiologique.

Indicationen

BACTIGRAS ist nur äußerlich anzuwenden.

9. Vorsichtsmaßnahmen BACTIGRAS sollte nicht auf mehr als 10 % der Körperoberfläche verendet werden.

10. Es sollte nicht benutzt werden, wenn eine Überempfindlichkeit oder Allergie gegen Chlorhexidin bekannt ist. In seltenen Fällen kann es zu Dermatitis, Kontakt- oder Lichtempfindlichkeit kommen. Es sind nur wenige Fälle einer anaphylaktischen Reaktion auf Chlorhexidin bekannt.

11. BACTIGRAS kann für folgende Wundarten verwendet werden:

- kleinere Verbrennungen und Verbrühen
- Rißwunden, Hautabschürfungen und andere Wunden mit Hautoberfläche

- Hautentnahmestellen sowie transplantierte Hautstellen
- Beingeschwüre.

Gebrauchsanweisung

1. Die Wunde mit einer Standardmethode reinigen.

2. Den Verband mit der richtigen Größe auswählen und den Beutel öffnen (Bei der Rollenverpackung an der Kerbe aufreißen).

3. Mit Hilfe einer Zange oder unter

Handelsformen

Bestell-Nr.

Abmessung

Verkaufseinheit

Karton mit 50 Stück

Karton mit 10 Stück

Karton mit 50 Stück

Karton mit 10 Stück

Karton mit 10 Stück

Karton mit 12 Rollen

Hersteller

Hergestellt in England von

Smith & Nephew Medical Limited, PO Box 81, Hessle Road, Hull HU3 2BN

*Warenzeichen von Smith & Nephew

© Smith & Nephew 2003

www.smith-nephew.com

BACTIGRAS®

Garza Imbevuta Di Paraffina Con Acetato Di Clorexidina

STERILE R Un solo uso. Esterilizado por radiación. No utilizar el contenido si el envase está roto o deteriorado. Almacenar en posición horizontal en un lugar seco (<25°C).

2. Selección de la medida de apósito correcta y abrir el envoltorio.

3. Utilizar guantes al retirar el papel protector.

4. Colocar el apósito en contacto directo con la superficie de la herida.

5. Aplicar un apósito secundario absorbente si es necesario y asegurarlo con un vendaje de retención o un apósito laminar de fijación.

6. Retirada del apósito. BACTIGRAS puede permanecer colocado aún cuando se retire el apósito secundario. La frecuencia de cambio dependerá de las circunstancias clínicas y pueden variar desde una vez al día hasta dos veces por semana.

7. Si el apósito se adhiere a la herida retirarlo suavemente lavándolo con solución salina.

Precauciones

BACTIGRAS no debe ser utilizado en más de un 10% del área corporal. No debe ser utilizado en casos conocidos de alergia o sensibilidad a la clorexidina. Dermatitis, sensibilidad de contacto o fotosensibilidad pueden ocurrir raramente. Se han detectado reacciones anafilácticas a la clorexidina, pero son muy poco frecuentes.

Raramente pueden ocurrir casos de dermatitis, sensibilidad de contacto o fotosensibilidad. Es stata riportata in rari casi una reazione anafilattica alla clorexidina.

Evitar el contacto con los ojos, oído medio, meninges y cerebro.

BACTIGRAS es incompatible con jabones, otros materiales aniónicos (Ej: algunos agentes limpiadores de la piel, así como yoduro potásico).

La utilización de BACTIGRAS junto con agentes oxidantes limpiadores (Ej: Eusol, peróxido de hidrógeno y soluciones que contengan yodo) debe ser evitada.

Istruzioni per l'uso

1. Pulire la ferita con la tecnica standard.

2. Selezionare la corretta

dimensione della medicazione ed aprire la busta lo strappare l'estremità della confezione, per il rotolo.

3. Haal het kompres met een pinzet, of gebruik handschoenen, uit de verpakking en verwijder het beschermend papier van beide kanten van het kompres.

4. Leg BACTIGRAS direct op de wond. Gebruik hiervoor één laag, leg indien nodig meerdere kompressen naast elkaar.

5. Leg een absorberend, bij voorkeur niet-verkleed, tweede kompres (bijvoorbeeld MEOLIN®) over de wond heen en fixeer dit met pleister of verband (bijvoorbeeld HYPAFIX® of EASIFIX®).

6. Verwijderen: BACTIGRAS kan in principe op de wond gelaten worden als het absorberende kompres wordt vervangen. De frequentie van verwisseling hangt af van het klinisch beeld van de wond en kan variëren tussen twee keer per week tot meerder kerken per dag.

7. Hoewel BACTIGRAS kan in principe op de wond gelaten worden als het absorberende kompres wordt vervangen, moet dit niet gebeuren omdat de clorexidine kan het voorkomen dat het kompres aan de wond vastkleeft.

8. Week BACTIGRAS dan in een steriele zoutoplossing (NaCl 0,9%) en verwijder het vervolgens

Precauzioni per l'uso

BACTIGRAS non dovrebbe essere usato su una superficie superiore al 10 % dell'area corporea totale. Non dovrebbe inoltre essere usato in casi di sensibilità o allergia alla clorexidina.

Raramente possono avvenire casi di dermatite, sensibilità da contatto o fotosensibilità. È stata riportata in rari casi una reazione anafilattica alla clorexidina.

Evitare il contatto con gli occhi, l'orecchio medio, le meningi e l'encefalo.

BACTIGRAS non è compatibile con i saponi o altre sostanze anioniche (es. alcuni detergenti cutanei) come pure allo ioduro di potassio.

Evitare l'uso di BACTIGRAS con sostanze ossidanti (es. Eusol, peróxido di hidrógeno) e soluzioni che contengano yodo.

Evitare il contatto con la pelle.

10. BACTIGRAS mag niet gebruikt worden op meer dan 10% van het lichaamsovervlak. BACTIGRAS dient niet te worden gebruikt bij overgevoeligheid of allergie voor chloorexidine. Dermatitis, kontaktgevoeligheid of photosensitiviteit kunnen sporadisch als reactie op chloorexidine voor.

11. Meldingen van analfyktische reacties op chloorexidine zijn bekend, maar zeer zeldzaam.

12. Vermijd contact met ogen, het midden-oor, de meningen en de hersenen. BACTIGRAS is onverenigbaar en kan niet gelijktijdig gebruikt worden met zeep, met sommige anionische materialen/stoffen (bijvoorbeeld sommige huidreinigende middelen) en met kalium-j

BACTIGRAS®

Vaselinkompress Med
Klorhexidin Acetat

STERILE Hver bandasje er enkeltpakket og sterilisert med gamma stråler. Ikke bruk innholdet hvis posen er åpenet eller ødelagt. Oppbevares liggende og tørt (<25°C).

Produktinformasjon

BACTIGRAS er laget av et vevet gassbindmateriale som er impregnert med parafin BP som inneholder 0,5% klorhexidin acetat BP. BACTIGRAS er pakket sterilt, enkeltvis i små bokser eller som ruller i en aluminiumspose.

Bruksinformasjon

BACTIGRAS brukes direkte på såret, over legges en absorberende bandasje.

Det antiseptiske klorhexidin acetatet i bandasjen slippes sakte ut og gir en langvarig virking mot gram positive og gram negative bakterier.

Indikasjoner

BACTIGRAS skal kun brukes til lokalbehandling. Den er spesielt egnet på sår hvor det lett oppstår infeksjoner eller hvor det allerede er en infeksjon. Sårtypene som er BACTIGRAS er spesielt egnet for:

- mindre brannsår og skolding av huden
- skrubbsår, flenger og andre sår hvor overhuden er borte
- donor og transplantasjoner
- leggsår.

Bruksanvisning

1. Rens såret på vanlig måte.

2. Velg riktig størrelse på

Produktsortiment

Art.nr.	Størrelse	Antall i esken
7456	5cm x 5cm	eske à 50 stk
7457	10cm x 10cm	eske à 10 stk
66003650	10cm x 10cm	eske à 50 stk
66003661	10cm x 40cm	eske à 10 stk
7461	15cm x 20cm	eske à 10 stk
66007505	15cm x 1m	eske à 12 ruller

Produsent

Produsert i England av
Smith & Nephew Medical Limited, Hull HU3 2BN
© Trade Marks of Smith & Nephew
© Smith & Nephew 2003
www.smith-nephew.com

BACTIGRAS®

Antiseptinen Voideside

STERILE Kertakäytöinen. Gammasteriltoitu. Älä käytä tuotetta, jos pussi on avautunut tai vaurioitunut. Säilytä pakkauksa vaakatasossa kuivassa paikassa (<25°C).

Kuvaus
BACTIGRAS on lenokudottu antiseptinen haroside. Se on kyllästetty vaseiliinilla, joka sisältää 0,5 % klorhexidiniasetaatti BP-tä. Steriili siteet on pakatu joko yksittäin tai rullina alumiiniukureen.

Vaikutus
BACTIGRAS toimii esteenä haavan ja toisen siteen välillä sellien haavaa suodatin pääsyn imukykyiseen toiseen siteeseen. Antiseptista klorheksidiniasetaattia erityttävästi siteestä, mikä antaa pitkäaikaisen suojan sekä Gram-positiivisia että -negatiivisia bakteereja vastaan.

Huom!
BACTIGRASilla saa peittää enintään 10 % ihon pinta-alasta. Sitä ei tule käyttää, jos potilas on yliherkkä tai allerginen klorheksidinille. Ihonlouhukset, kosketus- tai valoherkkyyttä saattaa ilmetä. Anafylaktisen reaktion voi havainnoida jo infektiotuntemassa haavoissa ja jo infektiotuntemassa haavoissa yhdystetyän antibiotiitoon. BACTIGRASilla voidaan käyttää:

- pienissä palovammoissa
- repeämässä, hiertyvässä ja muissa ihovaivoissa
- ihonsirroissa
- säärihävoissa.

Käyttöohjeet
1. Puhdistaa haava tavanomaiseen tapaan.

Saatavuus
Koodi Koko Pakaus

Art nr	Størlek	Förpackning
7456	5cm x 5cm	50 st
7457	10cm x 10cm	10 st
66003650	10cm x 10cm	50 st
66003661	10cm x 40cm	10 st
7461	15cm x 20cm	10 st
66007505	15cm x 1m	12 rll

Valmistaja
Smith & Nephew Medical Limited, Iso-Britannia

© Smith & Nephew 2003
www.smith-nephew.com

BACTIGRAS®

Antiseptisk Salvkompress

STERILE För engångsbruk. Steriliseringmetod: gammsteriliserad. Använd inte kompressen om enstycksförpackningen är skadad eller bruten. Förvaras torrt (<25°C).

Beskrivning
BACTIGRAS är en specialvävd lenogasväv impregnerad med mjuk vit paraffin innehållande 0,5 % klorhexidinacetat BP-tä.

Steril utfrörande som enstycksförpackade kompresser i

peel-open förpackning eller som rulle.

Egenskaper

BACTIGRAS verkar som en barriär mellan sår och kompress och möjliggör uppsugning av exsudat till en absorberande yt-kompress.

Klorhexidinacetatet ger en långvarig effekt på grampositiva och gramnegativa bakterier.

Försiktighetsåtgärder

BACTIGRAS får inte användas på mer än 10% av kroppsytan.

Kompressen bör inte användas vid konstaterad sensibilisering eller vid överkänslighet för klorhexidin.

Dermatitis, sensibilitet eller ljustäckslighet förekommer ytterst sällan. Allergisk reaktion mot klorhexidin har rapporterats och är sällan förekommande.

O anti-septiko acetaato de clorexidina e libertado lentamente do penso, proporcionando ação de longa duração contra bactérias Gram positivas e Gram negativas.

Indikationer

BACTIGRAS är avsett för lokalbehandling av mindre brännskador, skälvskador, lacerationer, skrubbsår, hudtransplantationer, tagställen och, bensår.

Bruksanvisning

1. Rengör såret på vanligt sätt.

2. Välj ut lämplig storlek på kompress.

3. Ta bort skyddspappret från

Finns i följande storlekar

Art nr Storlek Förpackning

7456 5cm x 5cm 50 st

7457 10cm x 10cm 10 st

66003650 10cm x 10cm 50 st

66003661 10cm x 40cm 10 st

7461 15cm x 20cm 10 st

66007505 15cm x 1m 12 rll

Tillverkare

Tillverkat i England av

Smith & Nephew Medical Limited, Hull HU3 2BN

Varumärke från Smith & Nephew

© Smith & Nephew 2003

www.smith-nephew.com

Valmistaja

Smith & Nephew Medical Limited, Iso-Britannia

© Smith & Nephew 2003

www.smith-nephew.com

BACTIGRAS®

Penso De Gaze Gorda Com Acetato De Clorexidina

STERILE Aplicação única. Esterilizada gama de irradiação. Não utilizar caso a saqueta esteja aberta ou danificada. Piso do armazém em lugar seco (<25°C).

Descrição
BACTIGRAS é uma gaze fina impregnada com Parafina Macia Branca BP que contém 0,5% de Acetato de Clorexidina BP.

É apresentado na forma estéril, como pensos individuais em saquetas de abertura com película fixá-lo com uma ligadura de retenção de penso ou com uma película de fixação de penso.

5. Aplicar um penso absorvente secundário, se necessário, e fixá-lo com uma ligadura de retenção de penso ou com uma película de fixação de penso.

6. Remoção. BACTIGRAS pode ser deixado no lugar quando o penso absorvente secundário for trocado. A frequência da troca dependerá das circunstâncias clínicas, e pode variar de uma vez por dia até duas vezes por semana.

7. Se o penso prender, embeber com soro fisiológico estéril e retirar cuidadosamente.

Modo de Acção

BACTIGRAS actua como uma barreira entre a ferida e um penso secundário, permitindo que o exsudado passe para o penso absorvente secundário. Dermatitis, sensibilidade ou ljustäckslighet förekommer ytterst sällan. Allergisk reaktion mot klorhexidin har rapporterats och är sällan förekommande.

O anti-septiko acetaato de clorexidina e libertado lentamente do penso, proporcionando ação de longa duração contra bactérias Gram positivas e Gram negativas.

Precauções para a utilização

BACTIGRAS não deve ser utilizado em mais de 10% da área corporal.

Não deve ser utilizado em casos de sensibilidade ou alergia à clorexidina. Raramente, podem ocorrer dermatite, sensibilidade de contacto ou fotossensibilidade. Foi descrita, embora raramente, reacção anafilática à clorexidina.

Evitar contacto com os olhos, ouvido médio, meninges e o cérebro.

BACTIGRAS é incompatível com sabões e outros materiais aniónicos (ex: alguns produtos de limpeza de pele), assim como com iodeto de potássio.

Deve evitarse a utilización de

BACTIGRAS con agentes de

limpeza oxidantes de limpeza de

feridas (ex: Eusol, água oxigenada e soluções de fóto).

Indicações

BACTIGRAS é apenas para uso

como tratamento tópico.

É indicado para uma ampla gama de feridas onde há risco de infecção ou em feridas já infectadas

concomitantemente com antibacterianos sistémicos. A gama de feridas nas quais BACTIGRAS pode ser utilizado incluem:

• pequenas queimaduras e escaldaduras

• lacerações, escoriações e outras feridas com perda de pele

• áreas doadoras e receptores de enxertos

• úlceras da perna.

Deve evitarse a utilización de

BACTIGRAS con agentes de

limpeza oxidantes de limpeza de

feridas (ex: Eusol, água oxigenada e soluções de fóto).

Instruções para a utilização

1. Limpar a ferida utilizando as

técnicas normais.

2. Selecionar o penso da

Apresentação do produto

Código Tamanho Embalagens

7456 5cm x 5cm Caixa de 50 pensos

7457 10cm x 10cm Caixa de 10 pensos

66003650 10cm x 10cm Caixa de 50 pensos

66003661 10cm x 40cm Caixa de 10 pensos

7461 15cm x 20cm Caixa de 10 pensos

66007505 15cm x 1m Caixa de 12 rolos